




Oblast použití	Četnost	Způsob aplikace	Název přípravku	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku	Expozice	
	Nástroje z chirurgické oceli, pomůcky z kovu, plastu, skla, aj.	po použití	ponořit do pracovního roztoku, po expozici opláchnout vodou	LAVOSEPT K - roztok	AV	koncentrát	30 min
		po použití	ponořit do pracovního roztoku, po expozici opláchnout vodou	LAVOSEPT K - koncentrát	AV	0,5 – 1,0%	30 min
	Hygienická dezinfekce kůže	na začátku pracovní směny; po použití toalety; před jídlem	umýt ruce mýdlem a nanést na suchou pokožku	LAVOSEPT KŮŽE	ABV	koncentrát	30 s
	Chirurgická dezinfekce rukou	při kontaminaci; před a po vyšetření pacienta; před výdejem stravy	umýt ruce mýdlem a nanést na suchou pokožku opakovaně po dobu 5 min	LAVOSEPT KŮŽE GEL	ABV	2 x 5 ml	5 min
	Dezinfekce kůže	před vpichem; před zavedením kanyly; před operačním zákrokem	místo vpichu dokonale smočít, nechat zaschnout, případně rozetřít tampónem	LAVOSEPT KŮŽE	ABV	koncentrát	30 s

Dezinfekční přípravky ředíme zpravidla ve vodě 20 – 25 °C.




Při manipulaci, při přípravě a následné práci s aplikačními roztoky dezinfekčních přípravků je nutné se řídit pokyny a návodem, který udává výrobce zpravidla na obalu výrobků, příp. v příbalovém informačním letáku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy čtěte údaje uvedené na obalu.

A	baktericidní (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Proteus vulgaris</i>)
V	fungicidní (<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Penicillium aurantiogriseum</i>)
B	virucidní (<i>E. coli</i> bakterifág phi X 174 a hostitelská <i>E. coli</i>)

Dezinfekční řád – plochy

AMOENÉ, s.r.o., Příbor

Oblast použití	Četnost	Způsob aplikace	Název přípravku	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku	Expozice
 Podlahy a obklady, chodby	1x denně a při kontaminaci	setřít namokro a nechat uschnout	LAVOSEPT K koncentrát	AV	0,5 – 1,0%	30 min
 Rychlá dezinfekce – malé plochy a předměty (vozíky, kliky, stoly, odpadkové koše, nábytek, aj.)	3x denně a při kontaminaci	rychlá dezinfekce postříkem – nastříkat a po expozici opláchnout	LAVOSEPT K roztok ve spreji	AV	koncentrát	30 min
Vany	po každém použití	nastříkat a po expozici opláchnout	LAVOSEPT K roztok ve spreji	AV	koncentrát	30 min
 Sociální zařízení – podlaha, WC, umyvadla, výlevky	2x denně	nastříkat a po expozici opláchnout	LAVOSEPT K roztok ve spreji	AV	koncentrát	30 min

Dezinfekční přípravky ředíme zpravidla ve vodě 20 – 25 °C.

Při manipulaci, při přípravě a následné práci s aplikačními roztoky dezinfekčních přípravků je nutné se řídit pokyny a návodem, který udává výrobce zpravidla na obalu výrobků, příp. v příbalovém informačním letáku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy čtěte údaje uvedené na obalu.

A	baktericidní (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Proteus vulgaris</i>)
V	fungicidní (<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Penicillium aurantiogriseum</i>)
B	virucidní (<i>E. coli</i> bakterifág phi X 174 a hostitelská <i>E. coli</i>)

Kontakt na výrobce: Amoené s.r.o., B. Němcové 1238, Příbor, 742 58

marketing@amoene.cz

+420 720 403 443